

## ►► Frengi (Sifiliz)

### Nasıl Bulaşır?

Sifilize neden olan *Treponema pallidum* adlı mikroorganizma sadece insanlarda hastalığa neden olur. Sağlam deri ve mukozadan kolayca penetre olur. 0-4 °C kanda 1-3 gün yaşayabilir. Sifiliz üç yolla bulaşır:


1. Orogenital ve anorektal temas dahil cinsel temas ile bazen öpüşmeyle ya da yakın vücut temasıyla bulaşabilir.
2. Anneden bebeğe,
3. Kan yolu ile.

Hastalığın bulaşma anından itibaren 10-90 günlük bir kuluçka süresi vardır. İlk temas yerinde bir kabarcık şeklinde başlayarak hızla gelişir ve şankır denilen ağrısız, sert tabanlı, zımbayla delinmişçesine düzgün kenarlı, kırmızı, yüzeysel, kenarları kalkık genellikle tek bazen çok sayıda ülserler (açık yaralar) görülür.




## ►► Bel Soğukluğu (Gonore)

Bel soğukluğu, etkeni *Neisseria gonorrhoea* olan, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavi edilmediği zaman bir çok organa zarar verir, kısırlığa yol açabilir.



## ►► Genital siğil (HPV)

Çok bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Etkeni Human papilloma virüsleridir. 100 virüs tipi tanımlanmıştır. Bu virüsün kanser yapan türleri 16-18 ve 33 diye adlandırılıyor. Aşı ile korunmak mümkündür.




## ►► Diğer hastalıklar

Non-Gonococcal Urethritis, Genital Herpes, Yumuşak Şankır (Trahom), Lymphogranuloma venereum, Granuloma inguinale, Uyuz ve Kasık Biti, Vajinal Akıntı, Molluscum Contagiosum.




Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
Sağlık Bakanlığı

# AIDS ve CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR



## » AIDS NEDİR?

AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu= Acquired Immunodeficiency Syndrome) virüs yoluyla bulaşan bir hastalıklar bütünüdür. Kişi virüsü cinsel yolla almışsa ortalama 8-10 yıl boyunca herhangi bir bulgu görülmeyebilir. Fakat virüsü aldığı andan itibaren başkalarına bulaştırabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu birçok hastalık ve kanserin ortaya çıkması ile AIDS oluşur. Hastalık ölümlerine sonuclandır.



## Bulaşma yolları:

- Cinsel Yolla
- Mikrobu taşıyan erkeğin veya kadının cinsel organ salgıları aracılığıyla, her türlü cinsel ilişki (vajinal, anal, oral) ile, erkekten kadına, kadından erkeğe, erkekten erkeğe, kadından kadına bulaşır.
- Kan Yoluyla
- Kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli ile, tıraş bıçağı, diş fırçası ve enjektör paylaşımı ile, kesici ve delici aletler yolu ile bulaşır.
- Anneden Bebeğe
- HIV'lı anneden gebelik süresince, doğum ve emzirme sırasında bebeğe bulaşır.


## Bulaşmadığı durumlar

- Günlük yaşamda ve sosyal ilişkilerle bulaşmaz.
- Öpüşme, dokunma, sarılma, el sıkışmayla bulaşmaz.
- Herkese açık tuvalet, havuz, duştan bulaşmaz.
- Başkalarının eşyalarını kullanmakla bulaşmaz.
- Sinek, böcek sokması, hayvan ısırması ile bulaşmaz.

Tanı ELISA yöntemiyle yapılan kan testiyle konulur. Kesin çözüm bulunamamıştır. Kullanılmakta olan tedavi pahalı ve zordur; birçok yan etkileri vardır.

## » CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

(CYBH), dünyada her zaman yaygın olarak bulunan, cinsel yaşamın doğası gereği özel olması nedeniyle toplumda tabulaştırılmıştır. CYBH, AIDS bulaşmasını kolaylaştırmaları HIV virüsünün daha kolay insandan insana geçişine olanak sağlıyor.



## Nasıl bulaşır?

CYBH her türlü cinsel ilişki ile bulaşır. Tuvaletten, hamamdan, yanaktan öpmeye, el sıkışmayla, aynı ortamda bulunma ve özel eşyalarını kullanmayla, sinek ve böcek ısırığıyla bulaşmaz.

## Nasıl korunayım?

Cinsel ilişkide bulunacağınız kişide sizi tedirgin eden bir belirti ile karşılaşırsanız cinsel ilişkide bulunmayınız. Her cinsel ilişkide kondom kullanınız! Yanınızda kondom bulundurunuz, kondom CYBH'ların birçoğuna karşı koruyucudur. Tek kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır! Dövme, epilasyon, kulak deldirme, piercing, manikür yaptırırken steril aletlerle yapılmasına dikkat ediniz!

## » Hepatit

Hepatit karaciğer hücresinin iltihaplanmasıdır. Nedenleri çok çeşitli olmasına rağmen en önemli sebepleri viral sebeplerdir.

Bu virüsler hepatit A, B, C, D ve E virüsleridir. B ve C türleri cinsel yolla bulaşmaktadır.

## Hepatitte Görülen İlk Semptomlar:

Hepatit virüsünü aldıktan sonra vücutta görülen semptomlar ani başlangıçlıdır.

İştah azlığı, kendini hasta hissetme, mide bulantısı, kusma ve çoğunlukla ateş, sigara kullananlarda sigaranın tadının kötüleşmesi, Eklem ağrısı ve deride kaşıntılı kızarıklıklar.

Hepatit A ve B'den korunmak aşı ile mümkündür.

